

Schede faunistiche di approfondimento – martora sarda

Ordine: Carnivori Famiglia: Mustelidi

Genere: Martes Specie: M. martes latinorum

Origine zoogeografica	Paleartica
Areale di distribuzione	Sardegna, Sicilia, Elba e Baleari La sua presenza in Sardegna viene fatta risalire alla fase preistorico – storica del popolamento faunistico dell'Isola, è stata introdotta
Identificazione	E' molto simile alla donnola ma di dimensioni superiori (lunghezza testa - corpo 43-50 cm) e ha una caratteristica macchia pettorale molto allungata di colore giallo - arancio; I colore della pelliccia è marrone con toni soffusi di giallo.
Habitat ed ecologia	Tipico abitatore e predatore degli ambienti boschivi maturi, vive di preferenza nelle foreste di latifoglie. Nell'Isola, in mancanza di competitori, la sua nicchia ecologica è più vasta e copmprende anche le zone coltivate e le macchie. E' un predatore di vertebrati di piccola e media taglia, generalmente Roditori e Lagomorfi; si nutre anche di insetti (Coleotteri ed Ortotteri) e di frutti e bacche selvatiche (more, fichi, carrube, pere, uva, etc.).
Riproduzione	La maturità sessuale viene raggiunta a circa 2 anni. L'accoppiamento avviene tra luglio e agosto; la gravidanza dura 8 - 10 mesi e i piccoli, da 2 a 5, nascono nella primavera successiva, tra marzo e aprile. Si rendono indipendenti al terzo mese.
Status di conservazione	Specie rara a livello regionale, non minacciata a livello italiano ed europeo.
Grado di protezione	Convenz. di Berna, All. III;L.R.23/98.